

Patient Information

Polish

Poparzenia u dzieci

Prosimy wszystkich rodziców i opiekunów o zapoznanie się z tą broszurą informacyjną.

W niezwykle rzadkich przypadkach po poparzeniu u dzieci może rozwinąć się poważna infekcja.

Zdarza się to bardzo często, ale może być groźne. Infekcję można wyleczyć pod warunkiem, że została wcześniej rozpoznana. Dziecko, którym się opiekujesz, należy obserwować pod kątem następujących objawów, które mogą wskazywać problem:

- gorączka,
- wysypka,
- biegunka,
- bóle mięśni,
- wymioty,
- ból głowy,
- ból gardła.

Jeśli u dziecka występują którekolwiek z wyżej wymienionych problemów, **prosimy ponownie zgłosić się z nim bezpośrednio na oddział ratunkowy (Emergency Department)**, przedstawiając tę ulotkę.

Do czasu zagojenia się poparzenia należy zachować czujność. Po zagojeniu się rany, nie występuje już dalsze zagrożenie infekcją.

Rana oparzeniowa powinna pozostać opatrzona do czasu otrzymania innych instrukcji. Należy stawić się na wizycie kontrolnej lub wizycie związanej ze zmianą opatrunku zgodnie z zaleceniami.

Jeśli życzysz sobie otrzymać tę ulotkę w innym formacie, na przykład dużym drukiem, zadzwoń na numer telefonu: 01935 384256.

